

Aborto en América Latina. Acceso de las mujeres a servicios

**Dr. Luis Távara Orozco
Presidente del Comité de DSyR, SPOG
Coordinador Regional para América del Sur
Iniciativa FIGO Prevención del Aborto
Inseguro**

Declaración de Conflicto de interés

- Declaro no tener ningún conflicto de interés en esta presentación

Objetivos

- Revisar cifras de aborto en el mundo y en las regiones
- Revisar el libro *Aborto Seguro*, de OMS
- Revisar recomendaciones de Conferencias y Convenciones internacionales
- Revisar la Iniciativa FIGO
- Discutir resultados de Iniciativa FIGO
- Discutir el aborto por razones no médicas
- Discutir los fundamentos del aborto seguro

Isabel Allende escribe:

- El aborto es un problema que afecta a casi todos, directa o indirectamente, por lo menos una vez en la vida. Nadie está a favor del aborto. Es una solución desesperada que tampoco agrada a nadie y que deja cicatrices emocionales y físicas
- La gente tiende a tener opiniones sobre el aborto, sin haber dedicado la debida atención y la profunda y amplia reflexión sobre este problema

Hoy en día, en el mundo hay

- 289,000 muertes maternas en 2013
- RMM: a nivel global 210, 230 en países en desarrollo, 16 en países desarrollados. 85 en LAC, LA 77, Caribe 190
- 42 millones de abortos, y de ellos 21.6 millones son de riesgo (AI)
- 4 Millones de abortos en América Latina
- 47,000 muertes por complicaciones de aborto

WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank. Trends in maternal mortality: 1990 to 2013; Geneva: WHO, UNICEF, UNFPA, WB 2014; pp68

Shah I, Ahman E. Unsafe abortion in 2008. Reproductive Health Matters 2010; 18:90-101


WHO. Unsafe abortion in 2008. Geneva:WHO 2010

Tasas de aborto por regiones 2016

Región geográfica	Tasa de A. Por 1000 mujeres 15-44 años
Mundo	35
-Regiones desarrolladas	27
-Regiones en desarrollo	37
Africa	34
Asia	36
Europa	30
LAC:	44
-Caribe	65
-América central	33
-Sud América	46
Norte América	17
Oceanía	19

Sedgh S, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional and subregional levels and trends. The Lancet 2016. Published on line may 11

Proporción de países que aceptan el aborto por diferentes circunstancias (*)



(*) Fuente: WHO 2003

Situación legal del aborto

Bajo Ninguna Condición:

- El Salvador
- Honduras (estado de necesidad)
- Nicaragua
- República Dominicana

Salvar vida:

- Costa Rica
- Guatemala
- Venezuela

Vida, salud y otros:

- México
- Chile
- Panamá
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Perú

Sin restricción:

- Cuba
- Mexico, DF
- Uruguay

Tasa de aborto en países con diferente legalidad

Legalidad del aborto	# Países	Tasa aborto
Prohibido, solo para salvar vida de madre	58	37
Salud física	34	43
Salud mental de la mujer	19	33
Causales socioeconómicas	10	31
A requerimiento	63	34

Sedgh S, et al. Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional and subregional levels and trends. The Lancet 2016. Published on line may 11

Clasificación de los abortos por su seguridad

- Abortos por año 2010-2014: 55.7 millones
- Abortos seguros: 30.6 millones (54.9 %)
- 17.1 millones (30.7%) menos seguros
- 8.0 millones (14%) no seguros
- De tal modo que 25.1 millones de abortos fueron inseguros
- 24.3 millones (97%) de esos abortos ocurrieron en países en desarrollo

Aborto inseguro por regiones

Región	# Abortos	A seguros	A inseguros
Global	55'700,000	54.9%	45.1%
P desarrollados	6'580,000	87.5%	12.5%
P en desarrollo	49'100,000	50.5%	49.4%
LAC	6'420,000	23.6%	76.4%
Caribe	519,000	25.4%	74.6%
América Central	1'310,000	18.4%	81.6%
Sud América	4'590,000	24.9%	75.1%

Ganatra B et al. Global, regional and subregional classification of abortion by safety 2010-2014. Lancet 2017. Published on line september 27, 2017

Safe abortion: technical and policy guidance for health systems

Second edition

Aborto seguro. Guia técnica y de políticas para sistemas de salud

- Durante las últimas dos décadas han surgido evidencias de salud pública y razones de derechos humanos que muestran la necesidad de proveer servicios de aborto seguro

Aborto seguro. Guia técnica y de políticas para sistemas de salud

- Casi todas las muertes y secuelas por AI podrían haberse evitado por medio de educación en sexualidad, planificación familiar y servicios de aborto legal y seguro

Recomendaciones de Conferencias y Convenciones Internacionales

- Asegurar que el aborto esté accesible en condiciones amplias
- Adoptar acciones para prevenir abortos inseguros, incluyendo la reforma de leyes restrictivas que amenazan la vida de mujeres y adolescentes



ETHICAL ISSUES IN OBSTETRICS
AND GYNECOLOGY
by the FIGO Committee
for the Study of Ethical Aspects of
Human Reproduction and Women's Health

OCTOBER 2009



Comité FIGO para el estudio de los aspectos éticos de la RH

- Se considera que el aborto está ampliamente justificado desde el punto de vista ético cuando se realiza por razones médicas para proteger la salud y la vida de la mujer
- Cuando los países han introducido legislaciones que permiten el aborto por razones no-médicas, la MMM asociada a estos procedimientos ha caído dramáticamente, sin cualquier aumento significativo en el número de abortos.

Aborto por razones no-médicas

Recomendaciones

Siempre que se haya realizado el proceso de consentimiento informado, el derecho de la mujer a la autonomía, combinado con la necesidad de evitar un aborto inseguro, justifica que se provea aborto seguro.

...Recomendaciones

- Respeto por su autonomía significa que no debe exigirse que un médico ... realice un aborto contra de sus convicciones personales
- Estos médicos, sin embargo, tienen la obligación de referir la paciente a un colega que no se oponga a realizar la interrupción del embarazo (O de C)

Aborto por razones no-médicas

En resumen, el Comité recomienda que después de consejería apropiada, las mujeres tienen derecho a acceder a aborto no médico, y que el equipo de salud tiene la obligación de dar ese servicio de la forma mas segura posible

Muerte materna

- El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna en los países donde el aborto es ilegal
- En LAC, el 10% de las MM son causadas por aborto
- Cerca de 760,000 mujeres en LAC son tratadas anualmente por complicaciones de aborto inseguro

WHAT ARE PREGNANT WOMEN DYING FROM?

28%

Pre-existing medical conditions exacerbated by pregnancy
(such as diabetes, malaria, HIV, obesity)

3%


Blood clots

8%

Abortion complications

9%

Obstructed labour and other direct causes



27%

Severe bleeding

14%

Pregnancy-induced high blood pressure


11%

Infections (mostly after childbirth)

OMS, May 2014

Maternal deaths: 1990 vs 2013

A




Fundamentos para promover el acceso a servicios de aborto seguro

- ◉ Los abortos inseguros causan sufrimiento y muerte
- ◉ La criminalización solo aumenta la mortalidad, no disminuye su incidencia
- ◉ Descriminalizar reduce dramáticamente la mortalidad
- ◉ Descriminalizar no aumenta los abortos
- ◉ La población no está a favor de penalizar a la mujer que aborta
- ◉ Los médicos temen el estigma, pero aceptan el aborto para sí mismos y personas próximas

Guía sobre Aborto Seguro de la OMS

Las probabilidades de que una mujer con embarazo no planeado se provoque un aborto son aproximadamente las mismas donde el aborto tiene más restricciones legales o donde está disponible a pedido de la mujer..

Tasa de aborto por sub-region (por 1000 mujeres de 15-44) según prevalencia de leyes liberales sobre aborto, 2008



Restrictiva

Liberal

Muertes por aborto antes y post legalización en Sudáfrica

Muertes asociadas a aborto en hospitales públicos por año


- 1994 (antes) 425
- 1998-2001 36

Dif. antes/despues -91%

Fuente: Jewkes & Rees, 2005

Evolución de la tasa de abortos post legalización en Francia

■ França




Fuente: The Alan Guttmacher Institute. Sharing responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide. New York: The Alan Guttmacher Institute, 1999 .

Evolución de la tasa de abortos post legalización en Francia e Italia


■ França

▲ Italia



Fuente: The Alan Guttmacher Institute. Sharing responsibility: Women, Society and Abortion Worldwide. New York: The Alan Guttmacher Institute, 1999 .

Proporção de embarazos terminados em aborto inducido después de la legalización del aborto en Turquía




Resultados de liberalizar leyes y facilitar acceso a aborto seguro

- Las mujeres que abortan son de alto riesgo para un nuevo aborto
- Como 50% o más de los abortos son repetidos, al reducirlos, cae la tasa total de abortos.
- Por eso la importancia de la anticoncepción post-aborto

Proporción de médicos/as peruanos/as que aceptarían el aborto por otras causas diferentes a las establecidas en la ley actual

Távora L y Sacsa D, 2008



1.- Peligra la vida

2.- Peligra la salud

3.- Malformación

4.- Violación sexual


5.- HIV progenitor/a

6.- En todas estas causas

7.- Otras causas

8.- En ninguna

Práctica médica frente a la solicitud de aborto legal si es mujer o en caso de ser su pareja



Távora L, Sacsá D, 2008

Como podemos reducir las MM por aborto inseguro?. Iniciativa FIGO

- Contribuyendo a la prevención del embarazo no deseado: MAC, Educación sexual
- Facilitando la interrupción del embarazo cuando está dentro de la ley de cada país
- Dejando de discriminar a la mujer con complicaciones de aborto y dándole PAC integral
- Fortaleciendo la AC postaborto. LARC

Estas intervenciones

- ◉ Las han adoptado muchos países desarrollados para reducir significativamente la morbi-mortalidad materna atribuible al aborto
- ◉ Muchos países en desarrollo están aún lejos de adoptarlas para reducir el alto costo humano del aborto inseguro
- ◉ Iniciativa FIGO (2007): Los médicos GO y las sociedades afiliadas son claves para influir en el tema

Algunos Resultados Am Central

País	PF	Acceso ILE	AMEU y/o miso	AC posaborto
Costa Rica	X	-----	X	X
Cuba	X	Hasta 12 S	X	X
El Salvador	X	-----	X	X
Guatemala	X	Salvar vida	X	X
Honduras	X	-----	X	X
Panamá	X	Salud, viola 23 ILE	X	X
Rep Dominic	X	-----	X	X

Fuente: X Taller FIGO Amer Central-Sud América, Panamá 2017

Algunos Resultados Am del Sur

País	PF	Acceso ILE	AMEU y/o miso	AC posaborto
Argentina	X	Por causales	X	X
Bolivia	X	Causales. 138 ILEs	X	X
Brasil	X	Causales. 2016: 1680	X	X
Chile	X	Causales	Empieza	X
Colombia	X	Causales	X	X
Ecuador	X	Causales	X	X
Perú	X	Causales: 169	X	X
Uruguay	X	A demanda	X	X

Fuente: X Taller FIGO Amer Central-Sud América, Panamá 2017

Quedan Pendientes Retos

- ◉ Reformas legales a las que se oponen grupos conservadores para mejorar acceso al aborto seguro
- ◉ Vencer barreras procedimentales, económicas, de información, culturales y otras
- ◉ Incorporar aborto en II Trimestre
- ◉ Aumentar acceso a PF y APA
- ◉ Mejorar calidad y cobertura de APA

¡¡¡ Gracias !!!
luis.tavara@gmail.com

