



RESUMEN EJECUTIVO

Guía de buenas prácticas para la atención del **aborto inducido** **a partir de 20 semanas** **de embarazo**

SERIE **Los tiempos
del aborto**

Documento N° 5



clacai

CONSORCIO LATINOAMERICANO
CONTRA EL ABORTO INSEGURÓ



CONSORCIO LATINOAMERICANO
CONTRA EL ABORTO INSEGUNTO

Los tiempos del aborto

Guía de buenas prácticas para la atención del aborto inducido a partir de 20 semanas de embarazo: resumen ejecutivo

Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro - CLACAI

© Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro CLACAI

Secretaría Ejecutiva hosted by PROMSEX

Av. José Pardo 601, oficina 604, Miraflores, Lima - Perú

511 4478668

susana@promdsr.org

www.clacai.org

Autores: Helena Paro, Mariana Romero, Ruth Zurbriggen, Damián Levy, Sonia Ariza

Navarrete, Natalia Acevedo Guerrero y Agustina Ramón Michel

Coordinación: Agustina Ramón Michel y Helena Paro

Asistentes: Martín Pont Vergés y Mariana Vazquez


Revisión Técnica: Guillermo Ortiz, Laura Gil, Alfonso Carrera, Nadya Scherbovsky
y Renata Catani

Agradecimientos: Analía Banfi, Beatriz Galli, Carmen Cecilia Martínez López, Cristina Rosero,
Dana Repka, Elizabeth Ruiz Hernández, Fausto Viteri, Graciela Lukin Mutov, Jennie Dador
Tozzini, Jorge Eduardo Caro, Josefina Miró Quesada Gayoso, Julio César Camelo, Leonel
Antonio Soto Restrepo, Linda Valencia, Malena Morales, Mara Zaragoza, Nina Zamberlin,
Ninde MolRe, Rebeca Ramos Duarte, Ricardo Antonio Escalante, Silvina Ramos, Soledad Deza
y Viviana Mazur.

1a. edición – Octubre 2025

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-11038

Este documento se publica bajo los términos y condiciones de la licencia Creative Commons -
Atribución - No comercial - Sin Derivar 4.0 Internacional



Serie: Los tiempos del aborto. Documento N° 5. *Guía de buenas prácticas para la atención
del aborto inducido a partir de 20 semanas de embarazo: resumen ejecutivo.* Agosto 2025.
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro/CLACAI.

Índice

Glosario	4
Introducción	5
¿Cómo se elaboró?	5
Alcance y objetivos	5
Parte 1: Abordaje inicial de las personas que solicitan un aborto a partir de 20 semanas de embarazo	5
Parte 2: Atención para la expulsión de los productos del embarazo	12
Parte 3: Atención después de la expulsión de los productos del embarazo	15
Parte 4: Tratamiento de las complicaciones posabortedo	17
Referencias	18
Anexos	
<i>Tabla 1. Informaciones necesarias para la consejería y la elección de la técnica de aborto inducido a utilizarse</i>	22 22
<i>Tabla 2. Medicamentos y técnicas utilizados para la IAF</i>	23
<i>Tabla 3. Aborto con medicamentos o dilatación y evacuación (DyE) para tiempos gestacionales a partir de 20 semanas</i>	24
<i>Tabla 4. Manejo no farmacológico y farmacológico del dolor en la atención del aborto a partir de 20 semanas</i>	25
<i>Tabla 4.1. Medicamentos utilizados para sedación moderada</i>	26
<i>Table 4.2. Medicamentos utilizados para sedación profunda</i>	26
<i>Tabla 5. Tratamiento de la hemorragia posabortedo según la causa</i>	27
<i>Tabla 6. Sugerencia de tratamiento antimicrobiano de la infección posabortedo</i>	28
Anexo I. Documento con pautas de adaptación para consentimiento informado de abortos a partir de 20 semanas	29
Anexo II. Sugerencia de documento escrito para acompañar el proceso	33

Glosario

Con la finalidad de facilitar la lectura y comprensión del documento, se presenta este glosario de términos.

Aborto inducido: Expulsión o extracción completa de un embrión o feto (independientemente de la duración del embarazo), luego de una interrupción deliberada de un embarazo en curso con medicamentos o por procedimientos, que no pretende dar como resultado un nacimiento vivo. Los abortos inducidos son distintos de los casos de aborto espontáneo y muerte fetal.

Aborto con medicamentos: Aborto inducido mediante el uso de agentes farmacológicos.

Aborto por procedimiento: Aborto inducido mediante el uso de procedimientos transcervicales como aspiración a vacío (manual o eléctrica) o dilatación y evacuación.

Aspiración manual endouterina (AMEU): Evacuación del contenido uterino mediante el uso de cánulas plásticas conectadas a un aspirador al vacío de plástico (jeringa de 60 mL).

Dilatación y evacuación (DyE): Procedimiento para evacuar el útero en embarazos con más de 12-14 semanas. Requiere la preparación cervical y es caracterizado por la evacuación uterina con pinzas fórceps y aspiración.

Guía de buenas prácticas (GBP): Conjunto de orientaciones para ayudar a profesionales de la salud y a personas tomadoras de decisión en las cuestiones relacionadas con diagnóstico adecuado, tratamiento, consejería u otros procedimientos clínicos para una determinada condición clínica. Se construye de manera colaborativa y su finalidad es orientar. Puede ser desarrollada por agencias gubernamentales de cualquier nivel, instituciones y organizaciones o por un grupo de personas expertas en el tema. Reconoce la complejidad y lo situado de las prácticas de acceso al aborto, y busca compartir y proponer líneas de acción para alcanzar los mejores estándares de bienestar. Asimismo, reconoce que existen malas prácticas a las que se pretende erradicar.

Inducción de asistolia fetal (IAF): Procedimiento para inducir la detención de la actividad cardíaca fetal, ya sea con medios quirúrgicos, como la transección del cordón umbilical, o con medicamentos, como la inyección de fármacos en la cavidad amniótica.

Productos del embarazo: Feto y placenta.

Tiempo gestacional: Duración de un embarazo, estimada a partir del inicio de la última menstruación o a partir de medidas ultrasonográficas.